

肺結核病的治療

你即將開始一個六至九個月的肺結核病 (TB) 療程。(在某些情況下療程會更長一些。)

治療肺結核的藥物

任何藥物都有副作用。治療肺結核的藥物也不例外。請遵照醫囑服用所有藥物。醫生在治療你的肺結核病過程中將密切注意所用藥物的副作用。如果出現副作用，你應當立即告訴醫生。

服用治療肺結核的藥物時應注意是否有以下副作用：

- 搔癢不退。
- 拉肚子、頭昏或沒有食欲。
- 手部或腳部有針刺感、麻木感或刺痛感。
- 出疹子，出現青腫或皮膚發黃。
- 視覺模糊。
- 尿呈深色。

及/或

- 眼睛發黃。

以下是治療肺結核的藥物，均為口服片劑。

ISONIAZID

此藥可能會使你感到疲倦，引起頭昏及失去食欲，它還會引起手、腳麻木或刺痛，但是這種情況很少發生。

RIFAMPICIN

利福平(Rifampicin)會降低避孕藥的藥效。服用避孕藥的婦女，開始服用利福平前應該告訴醫生。你應與普通醫生或去節育診所商量採用其它避孕方式。

如果你做過眼球晶狀體移植手術或使用隱形眼鏡，請告訴醫生，因為此藥會染污移植晶狀體及隱形眼鏡。

RIFAMPICIN 會導致尿、唾液及汗呈粉紅色，但是你不用為此擔憂。

ETHAMBUTOL 或 MYAMBUTOL

診所將定期檢查你的視力，但是，你的視力一旦開始變差，應立即告訴醫生。此時你還應停止服藥，聽候醫生的指導。

PYRAZINAMIDE

PYRAZINAMIDE 可能會使你頭昏，失去胃口。此藥一般僅在療程最初的兩、三個月時服用。如果出現莫名的疼痛、發燒或皮疹，請立即告訴醫生。

定時服藥

應遵照醫囑服藥，這點很重要。不定時服藥會引起嚴重反應，並會產生抗藥性。應避免喝酒，因為酒會增加藥物的毒性和副作用。

療程中的化驗

醫生會經常為你驗血，以確保藥物有效地治療你的肺結核。

醫生可能還會通過驗痰和驗尿等其它檢驗方式來檢查你的治療情況。

其它訊息

若需更詳盡的訊息，請聯絡：

TB Program
Disease Control Section
Department of Human Services
GPO Box 1670N
Melbourne 3001
電話：(03) 9637 4115

由 Infectious Diseases Unit, Public Health Branch, Department of Human Services 出版

此資料根據 1998 年 1 月的最新資料編寫。

由 Human Service Communications Unit 設計並製作。

此資料可從因特網上獲取，網址：

<http://hna.ffh.vic.gov.au>