
ການກວດຫາເຊື້ອ
ໂຣກປອດແຫ້ງ
ໂດຍການທົດລອງສັກ
ເຊື້ອຢາໃສ່ທີ່ຜິວໜັງ



Developed by the
Minnesota Department of Health,
Tuberculosis Prevention and Control Program
August 2002 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

Mantoux Skin Test for Tuberculosis, Lao

ເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງ ແລະ ການອັກເສບ

ໂຣກປອດແຫ້ງ
ສາມາດ ປົ່ນປົວໄດ້

ປອດແຫ້ງ

ເປັນພຍາດທີ່ອັນຕະຣາຍທີ່ສຸດ ທີ່ເກີດ
ມາຈາກ ວັນນະໂຣກ

ໂດຍຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກ

ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາແລະມັນກໍ

ທຳລາຍ ເນື້ອເຍື່ອຕ່າງໆຂອງຮ່າງ ກາຍ, ແລະມັນກໍມີ ຜົນກະທົບ
ກະເທືອນເຖິງ ປອດຂອງທ່ານອີກ, ຕລອດເຖິງທາງອະວັຍະວະ
ຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ. ທີ່ນີ້ ມີ ຈະລະບາດ ຕິດຕໍ່ ຈາກ ຜູ້ື່ງໄປຫາ
ອີກຜູ້ື່ງ ໂດຍທາງອາກາດຫາຍໃຈ.

ປະຕິກິຣິຍາ ຂອງ ພຍາດໂຣກປອດແຫ້ງ ນີ້ມີຄື:

- ໂອຫຼາຍ
- ໂອເປັນຂໍ້ກະເຍີ
- ໂອອອກເປັນເລືອດ
- ເຈັບໜ້າເອິກ ໃນເວລາໂອ
- ນ້ຳໝັກ ລຸດລົງ
- ເປັນໃຂ້
- ມີເທື່ອອອກ ໃນຕອນກາງຄືນ
- ເຈັບໃນບໍລິເວນ ບ່ອນທີ່ມີພຍາດເກີດ

ໃນເມື່ອເວລາ ຄົນເປັນໂຣກປອດແຫ້ງ ໂອ, ຈາມ, ແລະຮ້ອງ, ເຊື້ອ
ໂຣກນັ້ນກໍຈະເລື່ອນລອຍ ອອກໄປໃນອາກາດ.

ຄົນອື່ນກໍຫາຍໃຈເອົາອາກາດ ທີ່ມີເຊື້ອໂຣກເຂົ້າໄປໃນ ຮ່າງກາຍ,
ນີ້ເອີ້ນວ່າ ການປອດອັກເສບຈາກເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງ.

ບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຣກປອດອັກເສບ ນີ້ອາດຈະ:

- ບໍ່ມີອາການຫຼືປະຕິກິຣິຍາຫຼັງ
- ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບໃຂ້
- ບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະແຜ່ລະບາດ ເຊື້ອ

ໂຣກປອດນີ້ໄປຫາຜູ້ອື່ນໆ.

ພຍາດປອດແຫ້ງນີ້ຈະຝັງ ຕົວຢູ່ໃນ ຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນໄປນານ
ຫຼາຍໆປີ ໂດຍທີ່ບໍ່ທຳໃຫ້ເຈັບໃຂ້, ຖ້າຫາກຜູ້ໃດຕິດເຊື້ອໂຣກນີ້
ແລ້ວບໍ່ໄດ້ ກິນຢາປິ່ນປົວ, ເຂົາອາດຈະໄຂ້ໄດ້ຍ້ອນເຊື້ອໂຣກນີ້ ແລະ
ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍແກ່ຕົວຂຶ້ນ ແລະສາມາດແຜ່ລະບາດ ອອກຈາກ
ທ່ານ ໄປຕິດໃສ່ຜູ້ອື່ນ.

ທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງ ໄດ້ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານເຂົ້າ
ໄປຢູ່ໂກ້ກັບບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກປອດແຫ້ງ (ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ
ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຂົາເປັນໂຣກປອດແຫ້ງກໍຕາມ) ຄົນທີ່ວ່າໄປກໍຄືກັນ
ເຂົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງຕິດ ຫຼືມີເຊື້ອ ໂຣກປອດແຫ້ງ ຢູ່ໃນ
ຮ່າງກາຍ.

ການກວດໂຣກປອດແຫ້ງ ທີ່ຜິວໜັງMantoux

ການກວດທີ່ຜິວໜັງMantoux ເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທ່ານນັ້ນ
ຕິດໂຣກປອດແຫ້ງ ຈາກການຫາຍໃຈເອົາ ເຊື້ອໂຣກເຂົ້າ
ໄປທາງປອດ. ວິທີກວດນີ້ຄື ທ່ານໝໍຈະໄດ້ສັກເຊື້ອຢາ ທີ່ຊື່ວ່າ
ທູເບີຄລິນເຂົ້າຝັງໄວ້ທີ່ກ້ອງແຂນ ຂອງທ່ານ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍອາດຈະໂຕ່ ແລະມີປາມແດງ ເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນໄປ ພົບ
ທ່ານໝໍອີກຫຼັງຈາກ ສອງ
ສາມ ວັນ ທີ່ໄດ້ສັກເຊື້ອ ຢາ
ນັ້ນ ເຂົ້າ ໄປເພື່ອ ທ່ານໝໍຈະ
ໄດ້ ເບິ່ງ ຜົນປະກົດ ຂອງມັນ.

ການທົດລອງທີ່ຜິວໜັງ
ແມ່ນການກວດຊອກ
ຫາເຊື້ອໂຣກປອດ
ແຫ້ງ

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ຈະໄດ້ ສັກ
ຢາBCG (Bacille Calmette-Guerin)
ເພື່ອປ້ອງກັນໄວ້ແລ້ວໃນອະດີດ ກໍຕາມ. ແຕ່ທ່ານກໍຍັງຈະຕ້ອງໄດ້
ກວດວິທີນີ້ເພື່ອນຳກັນ. ເພາະວ່າການ ສັກຢາBCG ປ້ອງກັນໄວ້ນັ້ນ,
ບໍ່ໝາຍເຖິງວ່າ ມັນ ຈະ ຊ່ອຍ ປ້ອງກັນ ທ່ານໄດ້ໝົດຈາກ ການຕິດ
ຈາກ ເຊື້ອ ໂຣກ ປອດ ແຫ້ງ ນີ້.

ຖ້າຫາກວ່າຜົນຂອງການກວດໂຣກປອດແຫ້ງ ທີ່ຜິວໜັງ
ຫາກເຫັນ ວ່າທ່ານຕິດເຊື້ອໂຣກ ຫຼື
ທ່ານຫາກເກີດມີອາການຂອງໂຣກປອດ ແຫ້ງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ສ່ອງໄຟຟ້າ ເພາະຈະໄດ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ເຊື້ອໂຣກ
ນັ້ນໄດ້ທຳລາຍປອດ ຂອງທ່ານຫຼາຍເທົ່າໃດແລ້ວ.
ແລະອາດຈະໄດ້ກວດກາ ສິ່ງອື່ນໆອີກເພື່ອຈະໄດ້ ຮູ້ວ່າ
ທ່ານຄວນ ຈະໄຊ້ຢາປິ່ນປົວຫຼືບໍ່.

ການປິ່ນປົວຮັກສາ ໂຣກປອດແຫ້ງ ອັກເສບ

ບາງເທື່ອ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ຮັບປະທານຢາ ເພື່ອມັນຈະຊ່ອຍ
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໂຣກນີ້ ຕິດຂຶ້ນກັບທ່ານໃນອານາຄົດ.
ຢາເຫຼົ່ານີ້ຈະເໝາະສົມກັບບຸກຄົນ ຫຼື ທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ

- ຢູ່ໂກ້ຄຽງກັບຄົນຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກປອດແຫ້ງ
- ເຄີຍໄດ້ສ່ອງໄຟຟ້າ ໃນຜ່ານມາ ເພາະເຄີຍຕິດເຊື້ອໂຣກ
ປອດ
- ມີສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ສົມບູນ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈະມີໂອກາດ ທີ່ຈະເລີ່ມ
ເປັນໂຣກປອດແຫ້ງໄດ້.

ການປິ່ນປົວຮັກສາໂຣກປອດແຫ້ງ

ຢາປິ່ນປົວໂຣກປອດແຫ້ງ ນັ້ນມີສຳຮັບໄວ້ບໍ່ຮິການຢູ່ແລ້ວ.
ໂຣກປອດແຫ້ງນີ້ຈະປິ່ນປົວຮັກສາໄດ້ໃຫ້ເຊົາໝົດ
ນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການຮັບປະທານ ຢາ ຕາມຄຳສັ່ງ
ຂອງທ່ານໝໍທີ່ເຝິ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້.