
ໂຮກປອດເຂັງ



Developed by the
Minnesota Department of Health,
Tuberculosis Prevention and Control Program
January 1997 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

Tuberculosis Disease, Lao

ປອດແຫ້ງເປັນພຍາດທີ່ອັນຕະຣາຍທີ່ສຸດ ທີ່ເກີດມາຈາກ ວັນນະໂຣກ ໂດຍຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກ ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ເຮົາ ແລະມັນກໍ ທຳລາຍເນື້ອເຍື່ອ ຕ່າງໆຂອງ ຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນ ກໍມີ ຜົນກະທົບກະເທືອນເຖິງປອດ ຂອງທ່ານ ອີກ, ຕລອດ ເຖິງ ທຸກໆ ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ. ໂຣກປອດແຫ້ງນີ້ ຫຼື ທີ່ຍີ ນີ້ຈະລະບາດຕໍ່ ຈາກຜູ້ນຶ່ງໄປຫາອີກຜູ້ນຶ່ງ ໂດຍທາງອາກາດ ຫາຍໃຈ.

ໂຣກປອດແຫ້ງເກີດຈາກ ເຊື້ອໂຣກແລະແຜ່ຂະຫຍາຍ ຕົວຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ

ປະຕິກິຣິຍາ ຂອງພຍາດປອດແຫ້ງ

ຖ້າຫາກທ່ານມີເຊື້ອໂຣກນີ້ ຢູ່ໃນປອດຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະ:

- ໂອຫຼາຍ
- ໂອເປັນຂີ້ກະເຍີ
- ໂອອອກເປັນເລືອດ
- ເຈັບໜ້າເອິກໃນເວລາໂອ

ໃນເມື່ອເວລາ ທ່ານເປັນໂຣກປອດແຫ້ງ ຫຼືມີເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງ ຢູ່ໃນປອດ ຫຼື ຢູ່ໃນອະວິຍະວະສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ, ທ່ານອາດຈະມີອາການເຊັ່ນ:

- ນ້ຳໜັກ ລຸດລົງ
- ເປັນໂຂ້
- ມີເທື່ອອອກໃນຕອນກາງຄືນ
- ເຈັບໃນບໍຣິເວນ ບ່ອນທີ່ມີພຍາດເກີດ

ມີພຽງແຕ່ການກວດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດບອກ ໄດ້ວ່າທ່ານມີເຊື້ອໂຣກປອດຫຼືບໍ່

ຕ້ອງໄດ້ກວດ ຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກແທ້ຈິງວ່າ ທ່ານມີ ພຍາດປອດແຫ້ງຫຼືບໍ່.

ການກວດທີ່ຜິວໜັງ *Mantoux* ເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ ວ່າທ່ານນັ້ນຕິດໂຣກປອດແຫ້ງ ຈາກການຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອໂຣກ ເຂົ້າໄປທາງປອດ. ວິທີກວດນີ້ຄືທ່ານໝໍຈະໄດ້ສັກເຊື້ອຢາຊື່ວ່າ *tuberculin* ເຂົ້າຜົງໄວ້ທີ່ກ້ອງແຂນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ມັນກໍອາດຈະໂຄ່ ແລະມີປ່າມແດງເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກັບ ຄືນໄປຝົບທ່ານໝໍອີກຫຼັງຈາກສອງສາມວັນທີ່ໄດ້ສັກເຊື້ອຢານັ້ນ ເຂົ້າໄປເພື່ອທ່ານໝໍຈະໄດ້ເບິ່ງຜົນປະກົດຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຕ່ກ່ອນ ທ່ານເຄີຍໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໄວ້ແລ້ວ ຄືຢາ **BCG (Bacille Calmette-Guerin)** ແຕ່ທ່ານກໍຍັງຈະຕ້ອງ ໄດ້ກວດວິທີນີ້ເໝືອນກັນ ເພາະວ່າການສັກຢາ **BCG** ຈະບໍ່ ຊ່ອຍປ້ອງກັນໂຣກໄດ້ໝົດທຸກຊະນິດ. ແລະອີກຢ່າງນຶ່ງຢາທີ່ ທ່ານສັກປ້ອງກັນໄວ້ຄືຢາ **BCG** ນັ້ນ ຈະບໍ່ທຳໃຫ້ເກີດມີປະຕິ ກິຣິຍາຫຍັງທີ່ຈະກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການກວດທົດລອງໂຣກ ປອດແຫ້ງທີ່ຜິວໜັງແບບນີ້ **Mantoux skin test**.

ການສ່ອງໄຟຟ້າ ທີ່ໜ້າເອິກ ເປັນພຽງການກວດ ເພື່ອຈະໄດ້ ຮູ້ວ່າ ເຊື້ອໂຣກນັ້ນ ໄດ້ທຳລາຍປອດຂອງທ່ານຫຼາຍເທົ່າ ໃດແລ້ວ.

ທ່ານອາດຈະໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ໂອອອກມາເປັນຂີ້ກະເຍີ ເພື່ອຈະ ໄດ້ນຳເອົາມັນໄປວິໄຈກວດເບິ່ງວ່າເຊື້ອໂຣກນີ້ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ປອດຂອງທ່ານແລ້ວຫຼືຍັງ.

ການປ້ອງກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໂຣກປອດແຫ້ງ ແຜ່ລະບາດ ຕິດຕໍ່ໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນ

ຖ້າຫາກທ່ານເກີດເປັນໂຣກປອດແຫ້ງ ທີ່ກໍຕົວຂຶ້ນຢູ່ໃນປອດ ຂອງທ່ານແລ້ວ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະແຜ່ລະບາດ ພຍາດນັ້ນໄປ ຕິດໃສ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ ເຊື້ອໂຣກນີ້ຈະປົວອອກໄປ ໃນເມື່ອເວລາທ່ານ

ໂອ, ຮ້ອງ, ຫຼື ຈາມ ຕ້ອງໃຊ້ເຈ້ຍອະນາມັຍ ຫຼື ແຜ່ມືນ ປົກປິດປາກຂອງທ່ານໄວ້ ທຸກໆເວລາທີ່ທ່ານໂອ. ຜູ້ຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງທ່ານ ອາດຈະຫາຍໃຈ ເອົາເຊື້ອ ໂຣກປອດເຂົ້າໄປໃນປອດຂອງເພິ່ນ ນີ້ເອີ້ນວ່າ ການຕິດເຊື້ອ ໂຣກປອດແຫ້ງ. ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຄວນຈະໄດ້ຖືກກວດກາສຸຂະ ພາບຢ່າງຄັກແນ່ຈາກທ່ານໝໍ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ເພິ່ນນັ້ນຕິດ ເຊື້ອໂຣກແລ້ວຫຼືບໍ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໝໍຈິ່ງຈະໄດ້ສັ່ງຢາໃຫ້ ຮັບປະທານ ເພື່ອຈະໄດ້ປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ ໂຣກນີ້ໃຫ້ ຫັນເວລາ ແລະທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເຈັບປ່ວຍອີກຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ

ເຊື້ອໂຣກປອດນີ້ຈະບໍ່ແຜ່ລະບາດ ຕິດຕໍ່ນຳອາຫານ, ເຄື່ອງ ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ, ແລະເຄື່ອງໃນຫ້ອງນອນຕ່າງໆ.

ຖ້າຫາກທ່ານມີເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງ ທີ່ຜົງໄວ້ຢູ່ໃນພາກ ສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ (ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນປອດຂອງ ທ່ານ) ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລະບາດຕິດຕໍ່ເຊື້ອໂຣກ ນີ້ໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້.



ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານ ຕ້ອງຮັບປະທານຢາໄປຈົນ ໝົດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໝໍ

ຫຼັງຈາກທ່ານຮັບປະທານຢາຕີໂຣກປອດແຫ້ງ ໄປໄດ້ສອງ ສາມອາທິດ ທ່ານກໍເລີ່ມຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ແລະເມື່ອເຖິງເວລາ ນັ້ນແລ້ວ ທ່ານກໍບໍ່ສາມາດ ຈະແຜ່ລະບາດຕິດຕໍ່ເຊື້ອໂຣກ ນີ້ໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ອີກແລ້ວ. ທ່ານອາດຈະກັບຄືນໄປທຳ ງານ, ຫຼື ປະຕິບັດວຽກງານແນວໃດກໍໄດ້. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທ່ານຕ້ອງກິນຢາຕີໂຣກປອດແຫ້ງນັ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຕາມຄຳ ສັ່ງ ຂອງທ່ານໝໍ ເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງ ໃຫ້ໝົດ ໄປ ຈາກຮ່າງກາຍຂອງ ທ່ານ.